



Ricostruzione Palpebra Inferiore con Cicatrice Laterale Breve

Introduzione

La palpebra inferiore è la sede più frequente di neoformazioni a livello della regione orbitaria, vi può essere un coinvolgimento esclusivamente cutaneo o a tutto spessore. L'asportazione deve essere radicale e il difetto conseguente, implica tecniche ricostruttive che preservino la funzione e l'estetica della regione.

Materiali e Metodi

Riportiamo un caso di neoformazione pigmentata di circa 14 mm sul margine palpebrale, con coinvolgimento della congiuntiva, è stata eseguita una asportazione a tutto spessore, il difetto conseguente è maggiore di 1/3 dell'intera lunghezza palpebrale.

Le tecniche ricostruttive implicano l'utilizzo di lembi, con cicatrici che cadono oltre il bordo orbitario. Abbiamo eseguito una tecnica che libera completamente il tarso, rispetto al lembo muscolo-cutaneo di avanzamento, rendendo la cicatrice laterale molto corta.

Risultati

La ricostruzione ha permesso un perfetto allineamento del margine ciliare, senza alcuna tensione e distorsione palpebrale, la forma dell'occhio è risultata immutata.

Conclusioni

Riteniamo che sia una tecnica valida, di rapida esecuzione e da tenere nel bagaglio di tecniche disponibili nell'ambito della chirurgia palpebrale.

[Relazione presentata dal Dott. Enrico Calabrese](#)